

CALENDARIO DE VACUNAS 2020 ANDALUCÍA

6 AÑOS

Vacuna dTpa
Brazo: deltoides.
Brazo no dominante


VIA DE ADMINISTRACIÓN: IM

Jeringa precargada
Aguja intramuscular

12 AÑOS NIÑOS

1ª visita
Vacuna meningococo ACWY
Brazo: deltoides dcho.


VIA DE ADMINISTRACIÓN: IM

Jeringa precargada
Aguja intramuscular

2ª visita
Vacuna varicela
Brazo: deltoides izq.


VIA DE ADMINISTRACIÓN: SC

Jeringa + vial (reconstituir)
Aguja subcutanea

Nota: Si no están vacunados ni han pasado la varicela (2 dosis: 0-1 mes). Si se pusieron una dosis antes y no han pasado la varicela, se les pone la segunda dosis. Si han pasado la varicela o se han puesto dos dosis, se consideran inmunes.

12 AÑOS NIÑAS

1ª visita
Vacuna meningococo ACWY
Brazo: deltoides dcho.


VIA DE ADMINISTRACIÓN: IM

Jeringa precargada
Aguja intramuscular

1ª visita
Vacuna VPH
Brazo: deltoides izq.


VIA DE ADMINISTRACIÓN: IM

Jeringa precargada
Aguja intramuscular

Nota: Dos dosis (0-6m). Si tienen 14 años y no han sido vacunadas: tres dosis (0-2-6m).

2ª visita (30d después de la 1ª)
Vacuna Varicela
Brazo: deltoides.


VIA DE ADMINISTRACIÓN: SC

Hay que reconstituir
Aguja subcutanea

Nota: Si no están vacunados ni han pasado la varicela (2 dosis: 0-1 mes). Si se pusieron una dosis antes y no han pasado la varicela, se les pone la segunda dosis. Si han pasado la varicela o se han puesto dos dosis, se consideran inmunes.

3ª visita (a los 6 meses de la 1ª)
Vacuna Varicela
Brazo: deltoides dcho.


VIA DE ADMINISTRACIÓN: SC

Hay que reconstituir
Aguja subcutanea

3ª visita (a los 6 meses de la 1ª)
Vacuna VPH
Brazo: deltoides izq.


VIA DE ADMINISTRACIÓN: IM

Jeringa precargada
Aguja intramuscular

Nota: Para evitar pérdida de dosis se puede valorar la administración simultánea de segundas dosis de VARIVAX y GARDASIL en una única visita a los 6m de la 1ª visita, porque las vacunas vivas e inactivadas se pueden administrar el mismo día en miembros distintos. Además la separación mínima entre dosis de varicela es 1m pero idealmente por debajo de los 13 años se recomiendan 3meses (Según CAV). Si se decidiera separar en dos visitas pondríamos a los 3m de la segunda visita VARIVAX (3ª visita) y a los 6m de la primera visita GARDASIL (4ª visita).

14 AÑOS

Vacuna tétanos y difteria
Brazo: deltoides.
Brazo no dominante


VIA DE ADMINISTRACIÓN: IM

Jeringa precargada
Aguja intramuscular

15 Y 18 AÑOS

Vacuna meningococo ACWY
Brazo: deltoides.
Brazo no dominante


VIA DE ADMINISTRACIÓN: IM

Jeringa precargada
Aguja intramuscular

Nota: En 2020: Se realizara la captación y vacunación de las cohortes de nacidos y nacidas en 2002 y en 2005.

GARDASIL y VARIVAX: Se realizara la captación de niñas para vacunación hasta los 18 años.